

Eraquell 700 kg



Samenstelling	Bevat per gram 18,7 mg ivermectine.
Eigenschappen	Ivermectine is een macrocyclisch-lacton derivaat met een brede en krachtige antiparasitaire werking tegen nematoden en arthropoden. Het werkt door remming van zenuwimpulsen. De werkwijze omvat het gamma-aminoboterzuur (GABA), een neurotransmitterremmer op het niveau van de presynaptische zenuwuiteinden of op het niveau van neuromusculaire synapsen. Ivermectine stimuleert de afgifte van GABA bij de presynaptische zenuwuiteinden (in nematoden) of de neuromusculaire synapsen (in arthropoden en insecten), wat leidt tot verlamming en de dood van de betreffende parasieten.
Doeldier	Paard
Indicaties	Ter behandeling en bestrijding van infecties bij paarden tot 700 kg met de volgende parasieten: Maagdarmnematoden: Grote strongyliden: <i>Strongylus vulgaris</i> volwassen en L4 (arteriële) larvale stadia, <i>Strongylus edentatus</i> volwassen en L4 (weefsel) larvale stadia, <i>Strongylus equinus</i> volwassen, Kleine strongyliden, volwassen: <i>Cyathostomum</i> spp., <i>Cylicocyclus</i> spp., <i>Cylicodontophorus</i> spp., <i>Cylicostephanus</i> spp., <i>Gyalocephalus</i> spp., Trichostrongylidae: <i>Trichostrongylus axei</i> volwassen, Oxyuren: <i>Oxyuris equi</i> volwassen en onvolwassen, Ascariden: <i>Parascaris equorum</i> volwassen, Strongyloidea: <i>Strongyloides westeri</i> , volwassen, Maagwormen: <i>Habronema muscae</i> volwassen. Huidnematoden: <i>Onchocerca</i> spp. (microfilariae). Longnematoden: <i>Dictyocaulus arnfieldi</i> volwassen en onvolwassen stadia. Horzels: <i>Gasterophilus</i> spp. orale en gastrische larvale stadia
Toediening/dosering	Oraal. Een injector levert 140 mg ivermectine, voldoende om 700 kg lichaamsgewicht te behandelen in de aanbevolen dosering van 200 µg ivermectine per kg lichaamsgewicht. Het gewicht van het paard moet nauwkeurig worden bepaald voor een correct gebruik van de pasta. De mond van het paard moet vrij zijn van voer. De injector dient tussen de voortanden en de kiezen te worden ingebracht en de pasta moet op de tong achterin de mond van het paard worden toegediend. Til het hoofd van het paard enige seconden op om er zeker van te zijn dat de pasta wordt doorgeslikt. Een tweede behandeling moet plaatsvinden al naar gelang de epidemiologische situatie maar niet eerder dan 30 dagen na de eerste behandeling.
Contra-indicatie	Niet gebruiken bij merries die melk produceren voor menselijke consumptie.
Bijwerkingen	Bij enkele paarden met ernstige <i>Onchocerca microfilaria</i> infectie zijn na behandeling zwelling en jeukreacties opgetreden. Aangenomen wordt dat deze reacties het gevolg zijn van het afsterven van een groot aantal microfilaria. Deze symptomen verdwijnen vanzelf binnen enkele dagen, maar een symptomatische behandeling kan noodzakelijk zijn.
Wachttijdadvies	Slacht: 30 dagen Melk: niet gebruiken bij merries die melk produceren voor menselijke consumptie.
Waarschuwingen	Geen
Voorzorgen	Na gebruik handen wassen. Vermijd oog- en huidcontact. Mocht dit toch voorkomen, spoel dan goed met water. Niet roken, eten of drinken tijdens het toepassen van het product. Buiten bereik van kinderen houden. Honden en katten kunnen negatieve verschijnselen vertonen als gevolg van de concentratie ivermectine, indien zij in contact komen met gemorst product of gebruikte spuiten. Aangezien ivermectine uitzonderlijk gevaarlijk is voor vissen en andere waterorganismen dienen behandelde dieren niet in direct contact met oppervlaktewater te komen.

Eraquell 700 kg

vervolg

Bewaarcondities/Houdbaarheid	Bewaren in de originele verpakking beneden 30°C. Houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Na opening 6 maanden houdbaar.
Verpakking	Injector à 7,49 gram
Registratienummer	REG NL 9843
Kanalisatie	URA
Artikelnummer	90.005.73 Eraquell 12 injectoren 90.005.74 Eraquell Studpack 48 injectoren

