

Banminth[®] pasta



Breedspectrum ontwormingsmiddel voor honden

DIERGEENEESMIDDEL
REG NL 7563

Samenstelling:

Pyrantel (als pyrantelpamoaat): 7,5 mg per gram pasta.

Farmaceutische vorm:

Pasta

Eigenschappen:

Banminth[®] heeft een brede werking tegen de belangrijkste maag-darm wormen bij de hond.

Het verlamt de spiercellen van de wormen waardoor deze zich niet meer in de maag of darm kunnen handhaven en worden uitgedreven uit de gastheer. Pyrantel, de werkzame stof van Banminth[®], is relatief onoplosbaar en wordt vanuit de darm slechts weinig opgenomen in het lichaam. De werking blijft beperkt tot de parasieten die in de darm aanwezig zijn. De kleine hoeveelheid pyrantel die wel in het lichaam van het dier opgenomen wordt, zal snel afgebroken worden en is niet toxisch.

Diersoort:

Hond

Indicaties:

Behandeling van worminfecties bij de hond, veroorzaakt door:

- de spoelwormen *Toxascaris leonina* en *Toxocara canis*,
- de haakwormen *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma braziliense* en *Uncinaria stenocephala*.

10391100

81460125, R.O

FPO - Pharma 800



Dosering:

Eénmalig 5 mg pyrantel per kg lichaamsgewicht :

Injektor (16 g): de pasta tussen 2 maatstreepjes is voldoende voor 2 kg lichaamsgewicht.
De inhoud van 1 injektor is 16 g (12 maatstreepjes) en is voldoende voor 24 kg lichaamsgewicht.

Tube (24 g): 2 cm pasta uit de tube per kg lichaamsgewicht: zie cm aanduiding op de doos.
De inhoud van 1 tube is 24 gram en is voldoende voor 36 kg lichaamsgewicht.

Behandelingsschema:**Pups tot een leeftijd van 12 weken:**

- vanaf de 2e levensweek wekelijks ontwormen tot 2–3 weken na het spenen, daarna om de 14 dagen.

Honden ouder dan 12 weken:

- Reuen: -ontwormen om de 3 maanden
- Teven: -na iedere loopsheid ontwormen op 2, 4 en 6 weken
-buiten deze perioden ontwormen om de 3 maanden
-zogende teven altijd gelijktijdig met de pups ontwormen

Toedieningswijze:

Voor orale toediening.

De pasta kan direct ingegeven worden, eventueel met behulp van een vinger, spatel of lepel of door het voer gemengd worden. Vasten is niet nodig.

Contra-indicaties:

Geen.

10391100

81023833/81024031

Gebruik tijdens dracht en lactatie:

Banminth® pasta kan gebruikt worden bij drachtige of zogende teven.

Speciale voorzorgen voor de gebruiker:

In verband met eventuele huidirritaties en overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden.

Houdbaarheid:

Zie datum vermeld op de verpakking.

Voorzorgsmaatregelen bij bewaren:

Bewaren beneden 25°C.

Niet in de koelkast bewaren of invriezen. Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Verpakkingen:

-Injektor met doseerverdeling à 16 g.

-Tube à 24 g.

Registratiehouder:

Pfizer Animal Health BV

Postbus 37

2900 AA Capelle a/d IJssel

Nederland

Fabrikant:

Pfizer Animal Health

Louvain-la-Neuve

België

® = Merknaam van Pfizer Inc, NY, USA

