BIJSLUITER

CLINDACUTIN®

zalf voor honden

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
AST Farma
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

CLINDACUTIN zalf voor honden

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Per gram zalf:
Werkzaam bestanddeel:
Clindamycine (als clindamycinehydrochloride) 10 mg

INDICATIES

De voor dit middel vastgelegde indicaties zijn:
- Behandeling van oppervlakkige geinfecteerde wonden bij honden veroorzaakt door voor clindamycine gevoelige bacteriën (met name *Staphylococcus* spp. en *Streptococcus* spp.);
- Tussenteeneczeem veroorzaakt door *Staphylococcus intermedius.*

Als vuistregel voor een dosis-werkingsrelatie geldt dat de lokale concentratie van het antibioticum op de huid 10 tot 100 maal hoger dient te zijn dan de gevonden MRCwaarde(n).

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij:
- overgevoeligheid voor één van de bestanddelen;
- dracht.

BIJWERKINGEN

Diarree.

DOELDIER

Hond.

DOSERING EN TOEDIENINGSWEG

Uitsluitend bestemd voor lokale huidbehandeling bij honden. 3 tot 4 maal daags voorzichtig een dunne laag zalf op de te behandelen huiddelen aanbrengen tot verbetering optreedt en genezing is bereikt.

De maximale behandelingsduur bij oppervlakkige, geinfecteerde wonden is maximaal 7 dagen en bij tussenteeneczeem 14 dagen. Indien er binnen 3-4 dagen na het begin van de behandeling geen verbetering optreedt dient de behandeling te worden gestopt.

WACHTTIJD

Niet van toepassing.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Niet bewaren boven 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Bewaren in de originele verpakking. Houdbaarheid aangebroken verpakking: 30 dagen.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
- oplikken van de zalf dient voorkomen te worden;
- dit product is uitsluitend geschikt voor de behandeling van oppervlakkige huidaandoeningen;
- niet toedienen aan drachtige dieren.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden; draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie
Niet toepassen tijdens de dracht.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Antagonisme treedt op met ß-lactam antibiotica, chloramphenicol en macroliden.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Directe bijwerkingen, gerelateerd aan het gebruik van clindamycine bij honden zijn niet waargenomen, zelfs niet bij een veelvoud van de aanbevolen therapeutische dosering.

Onverenigbaarheden
Geen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE VERWIJDERING VAN HET ONGEBRUIKTE GENEESMIDDEL OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

16 oktober 2013

OVERIGE INFORMATIE

Aluminium tube met 20 g of 50 g zalf. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL 8043

KANALISATIE

UDD

AST farma

AST Farma B.V.
Oudewater