

Inflacam hond kauwtabletten



Samenstelling	Bevat per kauwtablet resp. 1 mg of 2,5 mg meloxicam.																																		
Eigenschappen	Meloxicam is een niet-steroïdale ontstekingsremmer (NSAID) uit de oxicamgroep waarvan de werking berust op inhibitie van de prostaglandinesynthese, zodat een anti-inflammatoir, analgetisch, anti-exsudatief en antipyretisch effect bewerkstelligd wordt. Het vermindert de infiltratie van leukocyten in ontstoken weefsel. In mindere mate remt het tevens de collageengeïnduceerde trombocyten aggregatie. In vitro en in vivo studies hebben aangetoond dat meloxicam cyclo-oxygenase-2 (COX-2) sterker remt dan cyclo-oxygenase-1 (COX-1).																																		
Doeldier	Hond																																		
Indicaties	Verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat bij honden.																																		
Toediening/dosering	Oraal. De aanvangsbehandeling is een éénmalige dosis van 0,2 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht op de eerste dag. Na een interval van 24 uur dient de behandeling te worden voortgezet met een onderhoudsdosis van 0,1 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht éénmaal per dag. Iedere kauwtablet bevat 1 mg of 2,5 mg meloxicam, dit komt overeen met een onderhoudsdosering voor een hond van respectievelijk 10 kg of 25 kg lichaamsgewicht. Iedere kauwtablet kan worden gehalveerd voor een nauwkeurige individuele dosering op basis van het lichaamsgewicht van het dier. Inflacam kauwtabletten kunnen met of zonder eten toegediend worden, zijn gearomatiseerd en worden door de meeste honden vrijwillig ingenomen. <u>Onderhoudsdosering:</u> <table><tr><th rowspan="2">Lichaamsgewicht (kg)</th><th colspan="2">Aantal kauwtabletten</th><th rowspan="2">mg/kg</th></tr><tr><th>1 mg</th><th>2,5 mg</th></tr><tr><td>4 - 7</td><td>½</td><td></td><td>0.13 – 0.1</td></tr><tr><td>7 - 10</td><td>1</td><td></td><td>0.14 – 0.1</td></tr><tr><td>10 - 15</td><td>1½</td><td></td><td>0.15 – 0.1</td></tr><tr><td>15 - 20</td><td>2</td><td></td><td>0.13 – 0.1</td></tr><tr><td>20 - 25</td><td></td><td>1</td><td>0.12 – 0.1</td></tr><tr><td>25 - 35</td><td></td><td>1½</td><td>0.15 – 0.1</td></tr><tr><td>35 - 50</td><td></td><td>2</td><td>0.14 – 0.1</td></tr></table> Het gebruik van Inflacam orale suspensie kan overwogen worden voor een nog nauwkeurigere dosering. Voor gebruik bij honden lichter dan 4 kg wordt het gebruik van Inflacam orale suspensie aangeraden. Klinisch effect wordt meestal binnen 3-4 dagen waargenomen. De behandeling dient te worden gestaakt wanneer er na uiterlijk 10 dagen geen klinische verbetering optreedt.	Lichaamsgewicht (kg)	Aantal kauwtabletten		mg/kg	1 mg	2,5 mg	4 - 7	½		0.13 – 0.1	7 - 10	1		0.14 – 0.1	10 - 15	1½		0.15 – 0.1	15 - 20	2		0.13 – 0.1	20 - 25		1	0.12 – 0.1	25 - 35		1½	0.15 – 0.1	35 - 50		2	0.14 – 0.1
Lichaamsgewicht (kg)	Aantal kauwtabletten		mg/kg																																
	1 mg	2,5 mg																																	
4 - 7	½		0.13 – 0.1																																
7 - 10	1		0.14 – 0.1																																
10 - 15	1½		0.15 – 0.1																																
15 - 20	2		0.13 – 0.1																																
20 - 25		1	0.12 – 0.1																																
25 - 35		1½	0.15 – 0.1																																
35 - 50		2	0.14 – 0.1																																
Contra-indicaties	Niet gebruiken bij drachtige of melkgevende dieren. Niet gebruiken bij honden die lijden aan gastro-intestinale afwijkingen zoals irritatie en bloedingen, verminderde lever-, hart- of nierfunctie en stollingsstoornissen. Niet gebruiken bij honden jonger dan 6 weken of lichter dan 4 kg. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.																																		
Bijwerkingen	Typische bijwerkingen van NSAID's zoals vermindering van de eetlust, braken, diarree, occult faecal bloed, lethargie en nierfalen werden af en toe gemeld. In zeer zeldzame gevallen is bloederige diarree, bloedbraken, gastro-intestinale ulceratie en verhoogde leverenzymen gemeld. Deze bijwerkingen komen gewoonlijk in de eerste behandelingsweek voor en zijn in de meeste gevallen van voorbijgaande aard en verdwijnen na het staken van de behandeling, maar kunnen in zeer zeldzame gevallen ernstig of fataal zijn. Indien er bijwerkingen voorkomen, dient de behandeling gestaakt te worden. In geval van overdosering dient een symptomatische behandeling te worden gestart.																																		

Inflacam hond kauwtabletten

Waarschuwingen	Niet gelijktijdig toedienen met glucocorticosteroiden, andere NSAID's of met anticoagulantia. Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Voorzorgen	Vermijd het gebruik bij gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren; in deze gevallen is er een potentieel verhoogd risico voor nefrotoxiciteit. Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd. Personen met een bekende overgevoeligheid voor NSAID's moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. In geval van accidentele inname, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
Bewaarcondities/ Houdbaarheid	Bewaren in de originele verpakking. Houdbaar tot 3 jaar na productiedatum.
Verpakking	Doos met 10 blisters à 10 tabletten.
Registratienummer	REG NL 110170/110171
Kanalisatie	UDA
Artikelnummer	90.009.40 Inflacam 1 mg hond kauwtablet 100 stuks 90.009.45 Inflacam 2,5 mg hond kauwtablet 100 stuks
EAN code	8714076006188 Inflacam 1 mg hond kauwtablet 100 stuks 8714076006157 Inflacam 2,5 mg hond kauwtablet 100 stuks

