

BIJSLUITER

NOVADOX® 10 mg/ml

orale suspensie voor honden en katten

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer
Nederland

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Novadox 10 mg/ml orale suspensie voor honden en katten

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per ml:

Werkzaam bestanddeel:

Doxycycline hydraat 11,547 mg
(overeenkomend met 10 mg doxycyclinebase)

Hulpstoffen:

Propylparabeen (E216)
Natriummetabisulfaat (E223)
Butylparabeen

INDICATIES

Voor de behandeling van:

Hond:

- Respiratoire aandoeningen, zoals infecties voorste luchtwegen, bronchitis, pneumonie en tonsillitis veroorzaakt door *Pasteurella* spp., *Bordetella* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. en *E. coli*;
- Otitis media veroorzaakt door *Pasteurella* spp.;
- Enteritis veroorzaakt door *Clostridium perfringens*;
- Urineweginfecties, zoals cystitis en nefritis, veroorzaakt door *E. coli*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Klebsiella Pneumoniae* en *Leptospira* spp.

Kat:

- Secundaire bacteriële infecties ten gevolge van het niesziektecomplex veroorzaakt door *Pasteurella* spp., *Bordetella* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. en *E. coli*.
- Urineweginfecties, zoals cystitis en nefritis, veroorzaakt door *Klebsiella pneumoniae*, *E. coli* en *Staphylococcus intermedius*;
- Otitis media veroorzaakt door *Pasteurella* spp.

CONTRA-INDICATIES

Geen bekend.

BIJWERKINGEN

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond en kat.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Voor orale toediening.

Twee maal daags 5 mg doxycycline (0,5 ml) per kg lichaamsgewicht gedurende 10 dagen; bij de behandeling van urineweginfecties gedurende 20 dagen.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

De druppels bij voorkeur gemengd met het voer toedienen.

WACHTTERMIJN

Niet van toepassing.

SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast bewaren. Niet invriezen. Bewaren in gesloten flacon.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.

Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: direct gebruiken, niet bewaren.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruikt tijdens dracht en lactatie

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet combineren met bactericide antimicrobiële middelen zoals penicillines en cephalosporines.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Overdoseringen op nuchtere maag kan resulteren in braken.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

1 maart 2016

OVERIGE INFORMATIE

Bruin glazen flacon (type III) à 10 ml (met doseerpijpet) en 30, 50 en 60 ml flacon (type III) met polypropyleen dop met aluminium-karton inlage.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht

REG NL 1654

KANALISATIE

UDD

1 Verwijder de dop.

2 Het bijgeleverde plugje is het opzetstuk voor de spuit. Druk deze in de flessenhals om de spuit te kunnen plaatsen. Het flesje is nu klaar voor gebruik.

3 Plaats de bijgeleverde spuit op het flesje.

4 Keer het flesje ondersteboven om de vloeistof op te zuigen.

5 Keer voor het eraf halen van de spuit, het flesje weer om.

6 Draai vervolgens ter bescherming van het product de dop weer op het flesje.

