

Vitaminthe ontwormingspasta



Samenstelling	Bevat per ml orale pasta 240 mg niclosamide en 30 mg oxbendazol.
Eigenschappen	Oraal toe te dienen breedspectrum anthelminthicum in pastavorm voor honden en katten. Niclosamide is specifiek werkzaam tegen lintwormen en oxybendazol bestrijdt zowel volwassen als larvale stadia van spoelwormen, zweepwormen en haakwormen. De pasta is geschikt voor toepassing bij honden en katten van alle leeftijden.
Doeldier	Hond en kat
Indicaties	Infecties met spoelwormen: <i>Toxocara canis</i> , <i>Toxocara cati</i> en <i>Toxascaris leonina</i> ; zweepwormen: <i>Trichuris vulpis</i> ; haakwormen: <i>Ancylostoma caninum</i> , <i>A. tubaeforme</i> en <i>Uncinaria stenocephala</i> ; lintwormen: <i>Dipylidium</i> spp. of <i>Taenia</i> spp.
Toediening/dosering	In een eenmalige dosering achter op de tong van het dier ingeven. Algemene dosering: 1 ml per 2 kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 15 mg oxybendazol en 120 mg niclosamide per kg lichaamsgewicht). Drachtige dieren: tijdens de drachtigheid heeft ontwormen weinig zin, aangezien de larven in het lichaam hiermee niet bereikt worden. Na de geboorte dient tegelijk met de eerste behandeling van de pups of kittens ontwormd te worden. Hierna telkens samen met de jonge dieren ontwormen. Alle andere honden en katten: 4 maal per jaar ontwormen en indien wormen in ontlasting en/of braaksel waargenomen worden. Pups: behandelen op een leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken en tot ze een half jaar zijn elke 2 maanden. Kittens: behandelen op een leeftijd van 4, 6 en 8 weken en tot ze een half jaar zijn elke 2 maanden.
Contra-indicaties	Niet toedienen aan drachtige dieren.
Bijwerkingen	Geen
Waarschuwingen	Vitaminthe wordt nauwelijks geresorbeerd, waardoor een maximale concentratie en werkzaamheid in het maag-darmkanaal wordt bereikt; een zo leeg mogelijk maag-darmkanaal bevordert dan ook de effectiviteit. In verband met het risico van uitspugen/braken kort na toediening dient vermeden te worden dat dit kan gebeuren op tapijt of ander textiel. Indien dit toch gebeurt, dan zo spoedig mogelijk reinigen met uitsluitend schoon water zonder reinigingsmiddelen.
Voorzorgen	<ul style="list-style-type: none"> - Lintwormen (<i>Dipylidium caninum</i>) worden overgebracht door vlooiën. Herbesmetting wordt voorkomen door gelijktijdig met het ontwormen een grondige vlooiënbestrijding toe te passen. - In verband met mogelijke overgevoelighedsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden; draag daartoe handschoenen bij toepassing.
Bewaarcondities/Houdbaarheid	Bewaren tussen 15-25°C. Houdbaar tot 1,5 jaar na productiedatum.
Verpakking	Doosje met 1 injector à 5 ml (1 doseerstreep = 0,25 ml), doosje met 1 injector à 10 ml (1 doseerstreep = 1 ml) en doosje met 1 injector à 25 ml (1 doseerstreep = 5 ml).
Registratienummer	REG NL 2896
Kanalisatie	Vrij
Artikelnummer	90.022.35 Vitaminthe ontwormpasta 5 ml 90.022.37 Vitaminthe ontwormpasta 10 ml 90.022.38 Vitaminthe ontwormpasta 25 ml

