

BIJSLUITER

DELVOSTERON, 100 mg/ml

134750 R1



SUSPENSIE VOOR INJECTIE VOOR HOND EN KAT



1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder:

Intervet Nederland B.V.

Postbus 50

5830 AB Boxmeer

Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1a

85716 Unterschleissheim

Duitsland

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

DELVOSTERON, 100 mg/ml suspensie voor injectie voor hond en kat

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per ml:

Werkzaam bestanddeel:

Proligeston 100 mg

Hulpstoffen:

Methylparahydroxybenzoaat (E218) 1,02 mg

Propylparahydroxybenzoaat (E216) 0,12 mg

4. INDICATIES

Oestruspreventie en oestrussuppressie.

5. CONTRA-INDICATIES

- Dieren in oestrus;
- Nog niet geslachtsrijpe teven en poezen;
- Drachtige dieren;
- Vaginale of uteriene infecties;
- Mammatumoren;
- Diabetes mellitus;
- Acromegalie.

6. BIJWERKINGEN

Haarverkleuring en atrofie van de huid op de injectieplaats.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond en kat.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Toediening via subcutane injectie.

Lichaamsgewicht < 3 kg	1	ml/dier
Lichaamsgewicht 3-5 kg	1-1,5	ml/dier
Lichaamsgewicht 5-10 kg	1,5-2,5	ml/dier
Lichaamsgewicht 10-20 kg	2,5-3,5	ml/dier
Lichaamsgewicht 20-30 kg	3,5-4,5	ml/dier
Lichaamsgewicht 30-45 kg	4,5-5,5	ml/dier
Lichaamsgewicht 45-60 kg	5,5-6,0	ml/dier
Lichaamsgewicht > 60 kg	1	ml/10 kg lichaamsgewicht (10 mg/kg l.g.)

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Schudden voor gebruik.

10. WACHTTIJD

Niet van toepassing.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25 °C.

Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: direct gebruiken.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

12. SPECIALE WAARSCHUWING

- Bij de poes is de reactie wisselend, krolsheid is soms erg kort onderdrukt.
- Niet gebruiken tijdens de dracht.
- Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

3 april 2012

15. OVERIGE INFORMATIE

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Doos met flacon à 20 ml.

REG NL 4119

16. KANALISATIE

UDA