

BIJSLUITER

DERMANOLON®

oplossing voor cutaan gebruik voor honden en katten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

AST Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Dermanolon oplossing voor cutaan gebruik voor honden en katten

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per gram:

Werkzame bestanddelen:

Triamcinolonacetonide	2,0 mg
Salicylzuur	20,0 mg

Hulpstoffen:

Ethyl alcohol (E1510)	660,5 mg
Benzalkonium chloride	0,5 mg

INDICATIES

Seborroïsche dermatitis op de huid.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor corticosteroïden of één van de hulpstoffen.

BIJWERKINGEN

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond en kat.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Voor cutaan gebruik.

Tweemaal daags op de te behandelen plek sprayen en laten drogen. Zo nodig licht uitwrijven. Bij hardnekkige gevallen kan de werking versterkt worden door een tweede en derde maal aan te brengen onmiddellijk na het opdrogen van de eerste applicatie. Toedieningsduur: maximaal 14 dagen.

WACHTTERMIJN

Niet van toepassing.

SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:
Aangebroken flacon: direct gebruiken, niet bewaren.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Niet in de ogen of slijmvliezen toepassen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en/of lactatie.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet dit diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEES- MIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

6 augustus 2015

OVERIGE INFORMATIE

Witte HDPE flacon met witte PP spraypomp en dop à 50 ml, 75 ml of 100 ml. Het kan zijn dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt worden gebracht.

KANALISATIE

UDA

REG NL 117324



AST Farma B.V.
Oudewater