

BIJSLUITER

Dexamethason 2 mg/ml Pro Inj.

oplossing voor injectie voor hond en kat

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLENDE

Alfasan Nederland BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nederland
Tel: 0348416945
Fax: 0348483676

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Dexamethason 2 mg/ml Pro Inj., oplossing voor injectie voor hond en kat.

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per ml:

Werkzaam bestanddeel:

Dexamethason (als dinatriumfosfaat) 2 mg

Hulpstoffen:

Methylparahydroxybenzoaat (E218) 1 mg

Propylparahydroxybenzoaat (E216) 0,1 mg

4. INDICATIES

- Inflammatoire aandoeningen van het locomotie apparaat, zoals arthritiden, tendinitis, tendovaginitis, synovitis.
- Allergische huidaandoeningen.
- Allergische aandoeningen van de longen, zoals astma bronchiale.

5. CONTRA-INDICATIES

Niet te gebruiken bij:

- Virusinfecties
- Diabetes mellitus
- Osteoporose
- Hartafwijkingen
- Nierafwijkingen
- Schimmelaafwijkingen
- Cornea ulcera
- Brandwonden
- Drachtige dieren in hoge doseringen

6. BIJWERKINGEN

- Abortus in het laatste deel van de dracht
- Afnemende weerstand tegen alle ziekteverwerkers; septicaemie en septische cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking.
- Bijniersuppressie bij langer durende behandeling, met bijnierinsufficiëntie bij belasting van het dier, zoals stress en bij acuut stoppen van therapie.
- Katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing
- Osteoporose
- Remming van de lengtegroei van de beenderen
- Huidatrofie
- Diabetes mellitus
- Polyurie, polydipsie
- Polyfagie
- Euforie
- Ulceraties in het gastro-intestinale systeem
- Pancreatitis
- Hyperlipidaemie
- Toename van de lypolysis

- Vettig infiltratie van de lever door steroid hepatopathie
- Remming van het hypothalamus-hypofyse-bijnierschors systeem
- Afname van de thyroïd sythese
- Toename van de parathyroïd synthese
- Morbus Cushing

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond en kat.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Toedieningsweg:

Hond en kat: intraveneus, intramusculair, intra-articulair.

Dosering

Hond en kat:

Intraveneus, intramusculair:

0,04-0,06 mg dexamethason per kg lichaamsgewicht per dag;

Intra-articulair:

0,5-5 mg dexamethason per gewricht per dag.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Een langdurige therapie mag niet abrupt gestaakt worden, maar dient door toedienen van degressieve doses beëindigd te worden.

10. WACHTTERMIJN

Niet van toepassing.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Bewaren na eerste aanpakken van de flacon: 28 dagen.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Zie bijwerkingen: abortus in het laatste derde deel van de dracht.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Overdosering

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen te verwachten dan die genoemd onder bijwerkingen.

Interactie

Geen, voor zover bekend.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

September 2011

15. OVERIGE INFORMATIE

12 x 100 ml flacons in polystyreen omverpakking.

REG NL 1578

KANALISATIE

UDD

