

BIJSLUITER

EOSC3430\_004\_R1

# DUPLOCILLINE® LA



suspensie voor injectie voor honden en katten

## 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder:

Intervet Nederland B.V.  
Postbus 50  
5830 AB Boxmeer

Fabrikanten verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet Productions S.r.l.  
Via Nettunense km. 20.300  
04011 Aprilia  
Italië

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer

## 2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Duplocilline LA, suspensie voor injectie voor honden en katten

## 3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per ml:

Werkzame bestanddelen:

Procainebenzylpenicilline	150.000 I.E.
Benzathinebenzylpenicilline	150.000 I.E.

Hulpstoffen:

Methylparahydroxybenzoaat (E 218)	1,2 mg
Propylparahydroxybenzoaat (E 216)	0,13 mg

## 4. INDICATIES

- Rhinitis, (broncho)pneumonie veroorzaakt door *Streptococcus* spp. of *Pasteurella* spp.
- Stomatitis veroorzaakt door *Fusobacterium necrophorum*
- (poly)Arthritis veroorzaakt door *Streptococcus* spp.
- Dermatitis veroorzaakt door *Streptococcus* spp.
- Urogenitale infecties veroorzaakt door *Streptococcus* spp.

## 5. CONTRA-INDICATIE

Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor penicillines en/of procaine.

## 6. BIJWERKINGEN

Allergische reacties kunnen voorkomen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiters worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

## **7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Hond en kat.

## **8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN**

Twee maal 1 ml/10 kg lichaamsgewicht (30.000 I.E. benzylpenicilline per kg lichaamsgewicht) met een doseringsinterval van 72 uur.

Intramusculaire of subcutane injectie.

## **9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING**

Geen.

## **10. WACHTTERMIJN**

Niet van toepassing.

## **11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN**

Bewaren in een koelkast bij 2-8°C. Beschermen tegen licht.

Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 8 weken.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

## **12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN**

- In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.
- Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.
- Bij overdosering worden geen andere verschijnselen waargenomen dan die genoemd worden onder Bijwerkingen.
- Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel.

## **13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

## **14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN**

1 augustus 2013

## **15. OVERIGE INFORMATIE**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Doos met flacon(s) à 50, 100 of 250 ml.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL 4251

## **16. KANALISATIE**

UDD

