

AA DERMALGIN®

Emulsie voor cutaan gebruik bij hond en kat



■ AA DERMALGIN®

flacon a 60 ml/120 ml met spuitverstuiver

Bevat: Neomycinesulfaat : 1,17 mg, Hydrocortisonacetaat: 1,34 mg.

BIJSLUITER: Dermalgin, emulsie voor cutaan gebruik bij katten en honden. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE: AA-Vet Diergeneesmiddelen N.V. Looftklapper 6-8, 8256 SL, Biddinghuizen. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL: Dermalgin, emulsie voor cutaan gebruik bij katten en honden. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN: Per ml Werkzaam bestanddeel: Neomycinesulfaat 1,17 mg, Hydrocortisonacetaat 1,34 mg, Hulpstoffen: Natrium methylparahydroxybenzoaat (E218). INDICATIES: Hond en kat: pyo(traumatische) dermatitis veroorzaakt door Staphylococcus aureus; brandwonden van de eerste graad. Kat: chronische dermatitis bij de kat veroorzaakt door Staphylococcus spp. CONTRA-INDICATIES: Geen. BIJWERKINGEN: Na langdurig gebruik kan superinfectie met gisten en schimmels plaatsvinden. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiters worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS: Hond en kat. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN TOE- DIENING: Cutaan gebruik. Schudden voor gebruik. Aangestaste plekken 2 - 3 maal per dag insmeren, bij verbetering 2 - 3 maal per week, gedurende maximaal 14 dagen. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING: Niet van toepassing.

WACHTTERMIJN: Niet van toepassing. **SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN:** Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP. **SPECIALE WAARSCHUWINGEN:** Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient. In verband met mogelijke sensibilisatie en overgevoelighedsreacties dient bij toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen. Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg. De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Onverenigbaarheden. Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen. **SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIETGEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN:** Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijderd. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu. **DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN:** 3 oktober 2012. **OVERIGE INFORMATIE:** Verpakkingsgroottes: Flacon van 60 ml, Flacon van 120 ml, Flacon van 500 ml. REG NL 2129 KANALISATIE. UDA.

aa-vet
diergeneesmiddelen N.V.