

Zoletil

■ SAMENSTELLING

	ZOLETIL 50	ZOLETIL 100
Bevat per flacon poeder :		
Tiletamine (als hydrochloride)	125 mg	250 mg
Zolazepam (als hydrochloride)	125 mg	250 mg
Bevat per flacon oplosmiddel :		
Steriel water voor injectie	5 ml	5 ml
Na het toevoegen van de 5 ml steriele vloeistof aan het poeder, bevat de gebruiksklare oplossing :	50 mg/ml	100 mg/ml

■ EIGENSCHAPPEN

Tiletamine is een krachtig dissociatief anestheticum uit de cyclohexaminegroep met uitstekende analgetische eigenschappen. Het geeft een kataleptische anesthesie met behoud van pharyngeale-, laryngeale- en ooglidreflexen. Zolazepam is een benzodiazepinederivaat met voornamelijk spierrelaxerende en anticonvulsieve eigenschappen, toegevoegd om de werkzaamheid van tiletamine te versterken en de bijwerkingen tot een minimum te beperken.

ZOLETIL werd ontwikkeld voor toepassing bij hond en kat, maar is inmiddels voor vele andere diersoorten geregistreerd.

De goede oplosbaarheid van ZOLETIL en de twee verschillende concentraties waarin het verkrijgbaar is maken het mogelijk zeer nauwkeurig en in kleine hoeveelheden te doseren bij kleinere diersoorten.

Bij het konijn en de cavia kan het soms, bij ingrijpende chirurgische ingrepen, nodig zijn ZOLETIL te combineren met een lokaal anestheticum.

De anesthesieduur bij ZOLETIL bedraagt 20-60 minuten, afhankelijk van de gebruikte dosering. Omdat de reflexen van larynx, pharynx en ooglid behouden blijven, kunnen deze niet als criteria dienen om de diepte van de anesthesie te beoordelen.

■ INDICATIES

Anesthesie en sedatie van hond, kat, laboratoriumdieren, niet voor consumptie bestemde rund-en hertachtigen en exotische diersoorten zoals vermeld in de doseringstabel.

■ CONTRA-INDICATIES

- Pancreasinsufficiëntie.
- Cardiologische-, respiratoire- en nierfunctiestoornissen.
- Drachtige dieren.

■ VOORZORGEN

- Cholinesterase-remmers, zoals bv. meeste vloeienbanden en druppels of tabletten tegen vloeien, dienen niet toegepast te worden gedurende 48 uur voor en na de narcose.
- Indien mogelijk, 12 uur voorafgaande aan de injectie met ZOLETIL, alleen water verstrekken.
- Atropinesulfaat kan als premedicatie 15 minuten vóór de injectie met ZOLETIL toegediend worden.
- Om uitdroging van de cornea te voorkomen wordt geadviseerd tijdens de anesthesie oogzalf aan te brengen.
- ZOLETIL passeert de placenta ; hiermee dient rekening gehouden te worden bij een sectio caesarea.

■ BIJWERKINGEN

Ademdepressie, apneu, tachycardie, convulsieachtige verschijnselen, spierkrampen, braken, speekselen en bronchiaalsecretie kunnen voorkomen.

■ WAARSCHUWINGEN

- Er dient rekening gehouden te worden met initiële cardiovasculaire instabiliteit in de vorm van tachycardie.
 - Bij de hond kan herstel van bewustzijn onvoorspelbaar en onregelmatig verlopen.
 - Na intramusculaire toediening bij de hond bestaat er kans op onrustig ontwaken met convulsieachtige verschijnselen en spierkrampen.
- Een rustige, donkere omgeving tijdens de recovery helpt dit te voorkomen.

■ TOEDIENINGSWIJZE

Hond : Intraveneus

Kat : Intraveneus of intramusculair

Overige diersoorten : Intramusculair

■ DOSERING

Niet toepassen bij voor consumptie bestemde dieren.

Intraveneus :

Hond	Kalmering voor onderzoek, sedatie	5 mg/kg
	Kleine ingrepen, korte anesthesie	71/2 mg/kg
	Grotere ingrepen	10 mg/kg
Kat	Kalmering voor onderzoek, sedatie	5 mg/kg
	Grotere ingrepen	71/2 mg/kg

Intramusculair :

Kat	Kalmering voor onderzoek, sedatie	10 mg/kg
	Grotere ingrepen	15 mg/kg

Laboratoriumdieren :

Cavia	10-25 mg/kg IM
Chinchilla.....	15 mg/kg IM
Fret	5 mg/kg IM
Gerbil	60 mg/kg IM
Hamster	40-60 mg/kg IM
Konijn	15-30 mg/kg IM
Muis	50-75 mg/kg IM
Rat	50 mg/kg IM

Overige (exotische) dieren :

Gorilla	2,0 mg/kg IM
Chimpansee	4,0 mg/kg IM
Leeuw	5,0 mg/kg IM
Grijze Wolf	11,0 mg/kg IM
Rode Vos	4,0 mg/kg IM
Bruine Beer	5,0 mg/kg IM
Ijsbeer : Mager	5,1 mg/kg IM
Vet	8,1 mg/kg IM
Varken	6,0 mg/kg IM
Gedomest. Rund	4,0 mg/kg IM
Europese Geit	5,0 mg/kg IM
Damhart	33,0 mg/kg IM
Schaap	8,0 mg/kg IM
Geelkuifkaketoe	2,6 mg/kg IM
Duiif	25,0 mg/kg IM
Kip	30,0 mg/kg IM
Papegaai	10,0 mg/kg IM
Parkiet	21,0 mg/kg IM
Pauw	11,3 mg/kg IM
Flamingo	22,0 mg/kg IM
Struisvogel	4,5 mg/kg IM
Boa Constrictor	22,0 mg/kg IM
Python Molurus	15,4 mg/kg IM
Roodwangschildpad	8,7 mg/kg IM
Rode Kangaroo	4,0 mg/kg IM
Zeeleeuw	1,2 mg/kg IM
Zeehond	4,7 mg/kg IM

De anesthesie kan verlengd worden met herhalingsinjecties ter grootte van 1/3 - 1/2 van de initiële dosering.

■ BEWAARING / HOUDBAARHEID

In donker bij kamertemperatuur (15/25°C) bewaren.

De gebruiksklare oplossing kan gedurende 48 uur bij kamertemperatuur of gedurende 10 dagen in de koelkast (4°C) bewaard worden.

■ VERPAKKING

ZOLETIL 50 : Doos met 1 flacon poeder (250 mg) + steriel oplosmiddel.

ZOLETIL 100 : Doos met 1 flacon poeder (500 mg) + steriel oplosmiddel.

Diergeneesmiddel U.D.D.

ZOLETIL 50 REG NL 2271

ZOLETIL 100 REG NL 2277

Importeur : Virbac Nederland BV · Barneveld

Fabrikant : Virbac Laboratories · 06516 Carros · France