

**BIJSLUITER**

Compagel gel voor paarden

**1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**Registratiehouder:

Boehringer Ingelheim bv  
Comeniusstraat 6  
1817 MS ALKMAAR

Fabrikant:

C.P.M. ContractPharma GmbH & Co KG  
Frühlingsstrasse 7  
83618 Feldkirchen-Westerham  
Duitsland

**2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Compagel gel voor paarden

**3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN**

Per 100 g gel:

**Werkzame bestanddelen:**

Natrium heparine	50.000 IE
Levomenthol	0,5 g
Hydroxyethyl salicylaat	5,0 g

**4. INDICATIES**

Behandeling van lokale inflammatoire zwellingen en kneuzingen inclusief tendinitis, tendovaginitis, bursitis en andere acute ontstekingen van het skeletspiersysteem bij paarden.

Het product bevordert ook de vroege heropname van hematomen en oedemateuze zwellingen voortkomend uit dergelijke aandoeningen.

**5. CONTRA-INDICATIES**

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen.

Niet aanbrengen op beschadigde huid.

Niet aanbrengen op open wonden of huidbeschadigingen (vers of met korst).

## **6. BIJWERKINGEN**

Indien bijwerkingen optreden, dient de behandeling gestaakt te worden.

Indien u bijwerkingen vaststelt bij uw paard/paarden die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

## **7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Paard

## **8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG**

Een totale hoeveelheid tot 50 g gel per dag dient met lichte druk van de vingertoppen op het te behandelen gebied te worden aangebracht. Volg hierbij de aanwijzingen van de dierenarts en behandel tot de symptomen verdwijnen.

## **9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING**

Zie rubriek: "Dosering en wijze van toediening".

## **10. WACHTTERMIJN**

(Orgaan)vlees: 0 dagen

Niet gebruiken bij drachtige of lacterende dieren die melk voor humane consumptie produceren.

## **11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN**

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Niet bewaren boven 25°C.

Na eerste opening binnen 3 maanden gebruiken.

De uiterste gebruiksdatum dient te worden bepaald op het moment van eerste opening en in de ruimte hieronder te worden geschreven. Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de tube na EXP.

## **12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN**

### **Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren**

Vermijd contact met ogen of slijmvliesen.

### **Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient**

Vermijd contact met open wonden of met de ogen.

Tijdens het aanbrengen van dit product dienen ondoorlatende handschoenen te worden gedragen.

**Gebruik tijdens dracht en lactatie**

Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar over topicaal gebruik van het product tijdens de dracht.

Gebruik wordt afgeraden tijdens de dracht en lactatie.

**13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-  
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

**14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN**

04 februari 2013

**15. OVERIGE INFORMATIE**

250 g

**KANALISATIE**

URA

REG NL 100327